

Dolor abdominal
Hipersensibilidad abdominal
Fiebre, leucocitosis

Radiografía abdomen
Ecografía abdominal

Colecistitis aguda

Ingreso hospitalario

Reposo digestivo
Fluidoterapia
Analgesia
¿AINE?

¿Antibióterapia?
Signos de sepsis
No mejoría inicial

Estratificación
Gravedad
Riesgo quirúrgico
(Escala ASA)



Disfunción
multiorgánica

Colecistitis aguda
CON criterios de gravedad

CA complicada en
las pruebas de
imagen

Bajo riesgo quirúrgico
(ASA I, ASA II)

Alto riesgo quirúrgico
(ASA III, ASA IV)

Colecistectomía
urgente

¿Colecistitis
gangrenosa?
¿Peritonitis
biliar?

Colecistostomía
percutánea

Deterioro clínico

Mejoría clínica

Alta y valorar
colecistectomía electiva



**Colecistitis aguda
SIN criterios de gravedad**

**Bajo riesgo quirúrgico
(ASA I, ASA II)**

**Alto riesgo quirúrgico
(ASA III, ASA IV)**

Mejoría clínica

Deterioro clínico

Deterioro clínico

Mejoría clínica

**Colecistectomía
electiva
durante
hospitalización**

**Colecistectomía
urgente**

**Colecistostomía
percutánea**

Alta

Deterioro clínico

Mejoría clínica

**Valorar
colecistectomía
electiva**

